

ep0542098/pn

L4 ANSWER 1 OF 1 WPINDEX COPYRIGHT 2001 DERWENT INFORMATION LTD
ACCESSION NUMBER: 1993-160634 [20] WPINDEX
DOC. NO. CPI: C1993-070886
TITLE: Prepn. of racemised 5-mono substd. hydantoin(s) -
comprises contacting with anion exchanger useful in
prepn. of pure aminoacid enantiomers in high yield.
B03 D16 E13
DERWENT CLASS: PIETZSCH, M; SYLDATK, C; WAGNER, F
INVENTOR(S): (DEGS) DEGUSSA AG
PATENT ASSIGNEE(S):
COUNTRY COUNT: 19
PATENT INFORMATION:

PATENT NO	KIND	DATE	WEEK	LA	PG	MAIN	IPC
EP 542098	A1	19930519	(199320)*	GE	11	C07D233-76	<--
R: AT BE CH DE DK ES FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE							
DE 4137581	A1	19930519	(199321)		5	C07D403-06	
JP 05201992	A	19930810	(199336)		7	C07D233-74	
US 5449786	A	19950912	(199542)		7	C07D403-06	
EP 542098	B1	20010613	(200134)	GE		C07D233-76	<--
R: AT BE CH DE DK ES FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE							
DE 59209904	G	20010719	(200142)			C07D233-76	

APPLICATION DETAILS:

PATENT NO	KIND	APPLICATION	DATE
EP 542098	A1	EP 1992-118795	19921103
DE 4137581	A1	DE 1991-4137581	19911115
JP 05201992	A	JP 1992-301996	19921112
US 5449786	A	US 1992-975170	19921116
EP 542098	B1	EP 1992-118795	19921103
DE 59209904	G	DE 1992-509904	19921103
		EP 1992-118795	19921103

FILING DETAILS:

PATENT NO	KIND	PATENT NO
DE 59209904	G Based on	EP 542098

PRIORITY APPLN. INFO: DE 1991-4137581 19911115
REFERENCE PATENTS: 7.Jnl.Ref; JP 03067580; WO 9108196
INT. PATENT CLASSIF.:

MAIN: C07D233-74; C07D233-76; C07D403-06
SECONDARY: C07B055-00; C07C227-24; C07D209-20; C07D233-78;
C12P013-04; C12P041-00

BASIC ABSTRACT:

EP 542098 A UPAB: 19931113
Racemisation of 5-monosubstd. hydantoins, comprises contacting the hydantoin with an anion exchanger at pH 6-13.5, in a solvent.
Also claimed is the apparatus, comprising; (i) a column filled with anion exchanger, having an entrance and exit; (ii) a means for supplying the hydantoin soln. to the column; and (iii) a means for collecting the racemised hydantoin soln. from the column.
The anion exchanger is organic pref. a DEAE-leaf or quat. ammonium gp.-contg. ion exchanger. The reaction temp. is 0-100 deg. C and the soln.

contains a buffer system, pref. glycine. The unracemised hydantoin is added at a concn. of 0.1-250 g/l, with the resulting racemised hydantoin enantiomers being cleaved by an enzyme, pref. a free or cell-linked enzyme to give pure L- or D- aminoacid enantiomer.

USE/ADVANTAGE - The use of racemised hydantoins in the prepn. of pure aminoacid enantiomers is claimed. The process takes place under mild conditions, is feasible for numerous substrates and produces a high yield of enantiomers in a short space of time. The process also avoids the need for transition metal cations and cpds., such as copper.

Dwg.0/3

FILE SEGMENT:	CPI
FIELD AVAILABILITY:	AB; DCN
MANUAL CODES:	CPI: B06-D01; B07-D09; B10-B02A; B10-B02B; D05-C01; E07-D09D

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

(11) Veröffentlichungsnummer: **0 542 098 A1**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG(21) Anmeldenummer: **92118795.1**(51) Int. Cl.⁵: **C07D 233/76, C07D 233/78,
C07D 233/74, C12P 41/00,
C12P 13/04**(22) Anmeldetag: **03.11.92**(30) Priorität: **15.11.91 DE 4137581**(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
19.05.93 Patentblatt 93/20(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AT BE CH DE DK ES FR GB GR IE IT LI LU MC
NL PT SE**(71) Anmelder: **DEGUSSA AG**
Weissfrauenstrasse 9
W-6000 Frankfurt (Main)(DE)(72) Erfinder: **Wagner, Fritz, Prof. Dr.**
Hohe Wiese 2
W-3300 Braunschweig(DE)
Erfinder: **Pietzsch, Markus**
Waggumer Strasse 59
W-3300 Braunschweig(DE)
Erfinder: **Syldatk, Christoph, Dr.**
Ernst-Heilmann-Grund 2
W-3200 Hildesheim(DE)(54) **Verfahren zur chemischen Racemisierung von 5-monosubstituierten Hydantoinen, Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens und Verwendung der Hydantoine.**

(57) 2.1. Bei der chemischen Synthese von Aminosäuren entsteht ein racemisches Gemisch, das meist durch enzymatische Spaltung aufgetrennt werden kann. Das verbleibende nicht gewünschte Enantiomere wird anschließend erneut racemisiert und wieder der Racemattrennung unterworfen. Bei Aminosäuren läßt sich diese Racemisierung auf einfache Weise in einem Temperatur-Zeit-Programm erreichen, bei Hydantoinen gelingt die Racemisierung nur bei 5-Arylhydantoinen in einer akzeptablen Zeit. Es soll daher ein Racemisierungsverfahren für Hydantoine zur Verfügung gestellt werden, das möglichst einfach, d. h. ohne problematische Fremdionen wie z. B. Kupfer oder zusätzliche Verwindungen durchführbar sein soll.

2.2. Bei dem neuen Racemisierungsverfahren wird das Enantiomer eines in 5-Stellung monosubstituierten Hydantoins in Anwesenheit eines Ionen austauschers umgesetzt. Bevorzugt sind Anionenaustauscher bei einem pH zwischen 6,0 und 13,5.

2.3. Darstellung enantiomerenreiner Aminosäuren durch enzymatische Hydrolyse aus 5-monosubstituierten Hydantoinen.

EP 0 542 098 A1

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Racemisierung von 5-monosubstituierten Hydantoinen, eine entsprechende Vorrichtung und die Verwendung der racemisierten Hydantoine.

Die bei der chemischen Synthese von Aminosäuren entstehenden Racemate werden meist durch enzymatische Spaltung in die einzelnen Enantiomere getrennt. Dies kann z. B. durch stereospezifische enzymatische Spaltung der N-acylierten Aminosäuren oder durch enantioselektive enzymatische Spaltung der entsprechenden in 5-Stellung monosubstituierten Hydantoinen erfolgen, wobei jeweils ein ungespaltenes Enantiomer der Ausgangsverbindung abgetrennt und nach einem Racemisierungsprozeß der enzymatischen Spaltung erneut unterworfen werden kann. Einen guten Überblick über mögliche Racemisierungen gibt E. Adams in P. D. Boyer, "The Enzymes", Vol. VI, New York, 1972, 479 - 507 (Amino Acid Racemases and Epimerases). Prinzipiell kann der Racemisierungsprozeß dabei auf chemischem, physikalisch-chemischem oder enzymatischem Wege erfolgen, wobei je nach Prozeßbedingungen auch kombinierte Verfahren möglich sind. Eine enzymatische Hydantoinracemisierung wird von M. Pietzsch in "Stereochemische Untersuchungen zur enzymatischen Hydrolyse von D,L-5-monosubstituierten Hydantoinen", Diplomarbeit, TU Braunschweig, 1989 beschrieben, wobei eine Racemase aus *Arthrobacter spec.* (DSM 3747) Verwendung fand. Enzymatische Verfahren haben jedoch den Nachteil, daß die bekannten Racemasen eine hohe Substratspezifität besitzen und deshalb nur für sehr spezielle Verfahren eingesetzt werden können. Für viele Hydantoine sind noch keine Racemasen bekannt.

Aus diesem Grund überwiegt bei den Hydantoinen wie auch Aminosäuren die chemische oder physikalisch-chemische Racemisierung, bei der die Edukte meist in einem basischen Milieu einem Temperatur-Zeit-Programm unterworfen werden. Für Aminosäuren sind auch Verfahren bekannt, bei denen die Racemisierung an stark basischen Anionenaustauschern durchgeführt wird, wobei relativ niedrige Temperaturen (25 - 45 °C) ausreichend sind. Diese Anionenaustauscher-Verfahren gelingen jedoch nur bei neutralen oder basischen Aminosäuren und erfordern die Verwendung von Kupfer(II)-Ionen, wobei als Zwischenstufe ein reaktiver Kupfer(II)-Schiff'sche Base-Komplex entsteht. Ein Überblick über diese Verfahren gibt G. C. Barrett, *Amino Acids and Peptides* 20, 1 - 51 (1989), spezielle Verfahren sind beschrieben in *Makromol. Chem.* 187, 1065 - 1076 (1986). Diese Verfahren sind äußerst aufwendig und nur im Labormaßstab durchzuführen, da neben den Kupferionen auch ein mit 4-Hydroxy-3-formylbenzolsulfonsäure (5-Sulfosalicylaldehyd) neutrali-


sierter Ionenaustauscher zur Anwendung kommt, der einerseits eine Regeneration erfordert und andererseits eine aufwendige Reinigung der erhaltenen Produkte, da insbesondere die Kupferionen quantitativ entfernt werden müssen. Außerdem hat die Verwendung von Übergangsmetallkationen den Nachteil, daß unter Umständen sehr stabile Komplexe mit den verwendeten Aminosäuren gebildet werden können.

Die chemische Racemisierung von 5-monosubstituierten Hydantoinen verläuft über die Keto-Enol-Tautomerie (*Chem. Rev.* 46, 403 - 470 (1950)) und wird, wie schon sehr früh festgestellt, durch Basen katalysiert (*Am. Chem. J.* 44, 48 - 60 (1910)). Neuere Untersuchungen über die chemische Racemisierung von Hydantoinen wurden nur mit speziellen Substraten durchgeführt, z. B. 5-(p-Hydroxyphenyl)-hydantoin in *Agric. Biol. Chem.* 51, 721 - 728 (1987) und 5-Benzylhydantoin in *J. Org. Chem.* 55, 4755 - 57 (1990). Die Untersuchungen zeigen, daß nur beim 5-(p-Hydroxyphenyl)-hydantoin eine schnelle Racemisierung aufgrund der Mesomeriestabilisierung durch den 5-Substituenten (50 % nach 20 min.) eintritt, alle anderen Hydantoine racemisieren erst nach mehreren Stunden.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist daher ein Verfahren zur Racemisierung von 5-monosubstituierten Hydantoinen, wobei die Racemisierung unter milden Bedingungen durchführbar und mit einer Vielzahl von Substraten möglich sein soll. Das Verfahren soll außerdem möglichst einfach in seiner Durchführbarkeit sein, d. h. auf problematische Fremdionen, wie z. B. verschiedene Übergangsmetallkationen oder zusätzliche Verbindungen, die aufwendig zu entfernen sind, sollte verzichtet werden können. Die Racemisierung soll dabei in einer annehmbar kurzen Zeit und unter guten Ausbeuten stattfinden. Aufgabe ist auch eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens.

Gelöst wird diese Aufgabe hinsichtlich des Verfahrens durch ein Racemisierungsverfahren, bei dem das Enantiomer eines in 5-Stellung substituierten Hydantoin in Anwesenheit eines Anionenaustauschers bei einem pH im Bereich 6 - 13,5 umgesetzt wird.

Die eingesetzten Hydantoine haben die allgemeine Formel



worin

* ein Symmetriezentrum bedeutet, an dem


die Racemisierung stattfindet, und
R ein Rest einer Aminosäure ist, wobei die
Aminosäure proteinogen oder nicht pro-
teinogen sein kann.

Typische Reste R sind

Phenyl



Benzyl



Isopropyl



Methylthioethyl



Vorteilhaft werden die racemisierten Hydantoine anschließend enzymatisch gespalten, wobei nur eines (i. d. R. das durch die Racemisierung wieder erhaltene) der beiden Enantiomeren umgesetzt wird. Das nicht gesplattene Hydantoinenantiomer kann anschließend von der entstandenen L- oder D- α -Aminosäure abgetrennt und erneut racemisiert werden. Die enzymatische Spaltung kann mittels freier Enzyme oder besonders vorteilhaft mit zellgebundenen Enzymen (ruhende Zellen) erfolgen. Vorzugsweise erfolgt die Spaltung bei 10° - 60° C und ggf. unter leichtem Rühren.

Die enzymatische Spaltung erfolgt in bekannter Weise. Allgemeine enzymatische Reaktionen sind beschrieben in R. Tsugawa, F. Okumura, T. Ito, Agric. Biol. Chem. **30**, 27 (1966). Die Herstellung von D- α -Aminosäuren ist in EP-A 0 400 638 (90 110 345.7) ausgeführt; L- α -Aminosäuren werden von C. Syldatk, V. Mackowiak, H. Höke, C. Gross, G. Dombach und F. Wagner in J. Biotechnol. **14**, 345 (1990) beschrieben.

Der Ionenaustauscher kann in Gelform, als Festkörper oder auch in flüssiger bzw. löslicher Form vorliegen. Gelförmige- und Festkörperionenaustauscher können dabei z. B. in Festbettreaktoren eingesetzt werden, flüssige bzw. lösliche Ionenaustauscher kommen meist z. B. in durchmischten Reaktoren zur Anwendung. Neben den Festbettreaktoren (z. B. Chromatographiesäulen)

sind die gelförmigen und festen Ionenaustauscher auch in durchmischten Reaktoren, wie z. B. Wirbelschicht-, gerührte- und Membranreaktoren einsetzbar.

Geeignet ist hierbei die Verwendung von Anionenaustauschern in einem pH-Bereich von 6,0 - 13,5, bevorzugt 6,5 - 11, wobei insbesondere stark basische Anionenaustauscher, z. B. solche mit quartären Ammoniumgruppen oder auf Phosphoniumbasis besonders gute Ergebnisse zeigen. Ist der pH zu niedrig, erfolgt keine Umsetzung; bei zu hohem pH racemisiert das Hydantoin auch ohne der Gegenwart des Ionenaustauschers. Bevorzugt wegen ihrer geringen Kosten sind dabei Ionenaustauscher mit zumindest teilweise organischem, vorzugsweise rein organischem Aufbau.

Besonders günstig ist, daß erfindungsgemäß das zu racemisierende Hydantoin in einer Pufferlösung mit dem Ionenaustauscher in Kontakt gebracht werden kann, so daß Nebenreaktionen weitgehend vermieden werden können. Mit dem Puffersystem kann insbesondere bei der Verwendung eines Festkörperionenaustauschers ggf. auch ein gewünschter pH eingestellt werden. Vorteilhaft ist hierbei, wenn das Puffersystem so gewählt wird, daß eine anschließende, z. B. enzymatische Spaltung des racemischen Gemisches in dem gleichen Puffersystem, gegebenenfalls unter Variation des pH's durchgeführt werden kann. Von besonderem Vorteil ist dabei auch, daß die Racemisierung am Ionenaustauscher kontinuierlich durchgeführt werden kann, da der Ionenaustauscher keiner Regeneration bedarf. Bei einem solchen kontinuierlichen Verfahren wird das zu racemisierende Hydantoin, vorzugsweise in einer Pufferlösung, einer mit dem Ionenaustauscher gepackten Säule kontinuierlich zugeführt, wobei vorzugsweise eine temperierte Säule verwendet wird, insbesondere wenn die Umsetzung stark temperaturabhängig ist. Säulendimension und Durchsatz an Hydantoin, d. h. Durchflußgeschwindigkeit des Systems bei einer bestimmten Hydantoinkonzentration, sollten so aufeinander abgestimmt sein, daß das die Säule in Lösung verlassene Hydantoin gerade praktisch vollständig racemisiert ist. Bei handelsüblichen Ionenaustauschern erfordert dies meist eine Kontaktzeit von Substrat und Ionenaustauscher zwischen 5 min und 2 h pro ml Ionenaustauscher bei einer Temperatur zwischen ca. 0 und ca. 100° C (Temperaturbereich bei wässrigen Lösungen), vorzugsweise 20 - 70° C und einer Konzentration von 0,1 - 250 g/l, vorzugsweise 0,2 - 50 g/l Hydantoin in Wasser bzw. dem Puffersystem.

Durchgeführt wird das Verfahren bei Festbettreaktoren günstigerweise mit einer typischen Chromatographieanlage, d. h. einer Säule, die mit einem Ionenaustauscher gefüllt ist, und auf deren Einlaß die Lösung des zu racemisierenden Hyd-

antoin gegeben wird, vorzugsweise in einem Puffer. Am Auslaß der Säule kann das Hydantoin direkt gesammelt oder über Kontrollmeßgeräte, wie z. B. ein Polarimeter, geleitet werden.

Das erfindungsgemäße Verfahren hat bei seiner verblüffenden einfachen Durchführbarkeit die überzeugenden Vorteile, daß mit einer einzigen Ionenaustauscherart eine Vielzahl unterschiedlicher Hydantoine racemisiert werden kann, die in 5-Position aliphatische, geladene oder anders funktionalisierte und/oder aromatische Substituenten enthalten. Nur bei einem Wechsel der Lösung sollte der Ionenaustauscher vorher mit dem Puffersystem erneut äquilibriert werden, eine Regeneration ist i. d. R. nicht erforderlich. Das erfindungsgemäße Verfahren eignet sich dabei gleichermaßen für die Racemisierung von D-5- und L-5-substituierten Hydantoinen, so daß das Verfahren bei der Produktion von D- und L- α -Aminosäuren Einsatz finden kann. Durch geeignete Wahl der Parameter (Puffersystem, pH, Ionenaustauschmaterial, Temperatur, Durchflußgeschwindigkeit) kann praktisch jedes eingesetzte Hydantoin vollständig racemisiert werden.

Das Puffersystem ist günstigerweise in einer Konzentration zwischen 0,005 und 1,0 mol/l, vorzuziehen sind Konzentrationen zwischen 0,01 und 0,1 mol/l. Geeignete Systeme sind z. B. Glycin (NaOH), Phosphat (K^+ , Na^+), Tris (HCl) (Tris(hydroxymethyl)-aminomethan), besonders gute Umsätze gibt Glycin / NaOH.

Prinzipiell kann auch ohne einem zusätzlichen Puffersystem verfahren werden, wobei gegebenenfalls der pH durch Zugabe von Säure (z. B. HCl) oder Base (z. B. NaOH) direkt zum zu racemisierenden Hydantoin eingestellt werden kann. Auch mit dem zu racemisierenden Hydantoin anfallende Begleitstoffe können in ein Puffersystem mit einbezogen werden.

Nicht funktionalisiertes Gelmaterial sowie Kationenenaustauscher sind als Katalysator ungeeignet (z. B. Sephacryl S-300, ein Gelfiltrationsmedium bzw. Amberlite IR-122, ein stark saurer Kationenenaustauscher), bedingt geeignet sind schwache Ionenaustauscher (z. B. vom DEAE-Typ, z. B. DEAE-Sephadex) und stark abgeschirmte (flüssige) Anionenaustauscher (z. B. Tetrabutylammoniumhydrogensulfat), da diese für einen vergleichbaren Umsatz wesentlich größere Verweilzeiten des Substrates auf der Säule erfordern, als starke Ionenaustauscher (z. B. Ionenaustauscher vom Q-Typ, z. B. Q-Sephadex von Pharmacia, Freiburg oder Amberlite IRA-410 (hydrophobe Polystyrolmatrix)).

Wird im basischen Milieu racemisiert, so steigt die Racemisierungsgeschwindigkeit mit dem pH, wobei dem oberen pH-Wert durch das Säulenmaterial und durch die Stabilität des Hydantoins

Grenzen gesetzt sind. Auch erhöhte Temperaturen beschleunigen die Racemisierungsgeschwindigkeit. Weiterhin wird die Racemisierungsgeschwindigkeit durch die Molarität des verwendeten Puffersystems und die Pufferart beeinflusst.

Das erfindungsgemäße Verfahren wird anhand von Figuren sowie der nachfolgenden Beispiele näher erläutert:

Fig. 1 zeigt schematisch einen Aufbau zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens,

Fig. 2 die Racemisierung von D-5-Indolmethylhydantoin (D-5-IMH) an Q-Sephadex in Abhängigkeit von der Flußrate, und

Fig. 3 die Racemisierung von D-5-IMH an Amberlite IRA 410 in Abhängigkeit von der Flußrate.

In einer Vorlage 1 befindet sich eine Lösung 2 des Puffersystems und des zu racemisierenden Hydantoins. Eine Schlauchpumpe 3 saugt über eine Leitung 4 die Lösung 2 an und pumpt diese über eine Verbindung 5 auf eine Säule 6, die einen Temperiermantel 7 aufweist, der mit einem Thermostaten 8 verbunden ist. Die Säule 6 ist mit einem Ionenaustauschergel 9 gefüllt. Der Auslaß 10 der Säule 6 ist mit einem Durchflußpolarimeter 11 verbunden, dessen Auslaß 12 über eine Leitung 13 an einem Sammelgefäß 14 endet, in dem die Lösung 15 mit dem racemisierten Hydantoin aufgefangen wird.

Die Vorlage 1 kann kontinuierlich oder diskontinuierlich mit der anfallenden Lösung 2 beschickt werden. Zur weiteren Kontrolle kann nach der Säule 6 bzw. nach dem Polarimeter 11 auch ein Autosampler für z. B. HPLC-Messungen zwischengeschaltet werden. Die anfallende Lösung 15 kann, sofern gewünscht auch in einem Fraktions-sammler gesammelt bzw. direkt einer weiteren Racematspaltung zugeführt werden.

In den folgenden Beispielen wurde - sofern nicht anders vermerkt - für die Säule 6 eine temperierbare Säule XK-16/10 von Pharmacia, Freiburg verwendet, die mit ca. 32 ml entgastem Anionenaustauscher Q-Sephadex fast flow (Pharmacia) bei einer Flußrate von 2,0 ml/min gepackt und mit dem jeweiligen Puffersystem, das zur Herstellung der Substratlösung Anwendung findet, äquilibriert (ca. 200 ml) wurde.

Der Umsatz gibt den Prozentsatz des eingesetzten Hydantoin-Enantiomeren an, der racemisiert wurde, ein 50 %iger Umsatz bedeutet entsprechend ein Enantiomerenverhältnis von 3 : 1.

Beispiel 1

Als Substratlösung wurde eine Lösung von 0,2 g L-5-Indolmethylhydantoin in 1000 ml 0,05 M

Glycin-Puffer (Na^+ , pH 8,5) eingesetzt. Die Säule wurde auf 37°C temperiert und die Substratlösung mit einer Flußrate von 0,6 ml/min über die Säule gepumpt. Bei dieser und allen geringeren Flußraten wurde das Hydantoin praktisch vollständig racemisiert ($\geq 99\%$).

Beispiel 2

Es wurde wie in Beispiel 1 verfahren, mit dem Unterschied, daß anstelle der Q-Sephrose fast flow DEAE-Sephrose fast flow (Pharmacia) verwendet wurde. Äquiliibriert wurde die Säule mit einem Tris/HCl-Puffer (0,02 M, pH 8,5). Bei einer Flußrate von 0,1 ml/min. wurde eine Racemisierung von 92 % ermittelt.

Vergleichsbeispiel 1

Es wurde wie in Beispiel 2 verfahren, mit dem Unterschied, daß anstelle der DEAE-Sephrose fast flow Sephacryl S-300 (Pharmacia) verwendet wurde. Unter den gegebenen Bedingungen konnte keine Racemisierung beobachtet werden.

Beispiel 3

Wie in Beispiel 1 beschrieben, wurde L-5-Indolylmethylhydantoin racemisiert, wobei für die Puffer- und Substratlösung ein Phosphat-Puffer (0,05 M, K^+ , pH 6,5) eingesetzt wurde. Bei einer Flußrate von 1,2 ml/min wurde eine Racemisierung von 6 % erreicht.

Beispiel 4

Beispiel 3 wurde mit einem Phosphat-Puffer (K^+) vom pH 7,5 wiederholt. Bei einer Durchflußrate von 0,6 ml/min wurde eine Racemisierung von 42 % erreicht.

Beispiel 5

Beispiel 4 wurde wiederholt mit einem Phosphat-Puffer (K^+) von pH 8,5. Allein durch die Variation des Puffermediums gegenüber Beispiel 1 veränderte sich der Umsatz, unter den gegebenen Bedingungen wurde eine Racemisierung von 64 % erzielt.

Beispiel 6

Beispiel 1 bzw. 5 wurde dahingehend variiert, daß als Puffer- und Substratlösung 0,02 M Tris/HCl-Puffer (pH 8,5) eingesetzt wurde. Der Umsatz der Racemisierung betrug bei der Flußrate 0,6 ml/min 66 %.

Beispiel 7

Es wurde wie in Beispiel 5 verfahren, mit dem Unterschied, daß als Substratlösung eine Lösung von 1,0 g D-5-Methylthioethylhydantoin in 1000 ml des Phosphat-Puffers eingesetzt wurde. Bei einer Flußrate von 0,3 ml/min. findet die Racemisierung des Substrates mit einem Umsatz von 66 % statt.

Beispiel 8

Es wurde verfahren wie in Beispiel 6, mit dem Unterschied, daß eine Lösung von 1,0 g L-5-Carboxyethylhydantoin in 1000 ml des Puffers verwendet wurde. Bei einer Flußrate von 0,3 ml/min und geringer tritt eine vollständige Racemisierung des Substrates ein.

Beispiel 9

Das Beispiel 8 wurde dahingehend variiert, daß L-5-Isopropylhydantoin verwendet wurde. Es wurde eine Racemisierung von nur 10 % erreicht.

Beispiel 10

Das Beispiel 9 wurde bei einer Säulentemperatur von 70°C wiederholt bei sonst gleichgebliebenen Bedingungen. Bei dieser und allen höheren Temperaturen tritt eine vollständige Racemisierung des Substrates ein.

Beispiel 11

Mit diesem Beispiel wurde die Abhängigkeit des Umsatzes von der Flußrate untersucht, das Ergebnis ist in Fig. 2 graphisch abgebildet, es besteht ein linearer Zusammenhang zwischen der Flußrate und dem Umsatz.

Als Substratlösung wurde eine Lösung von 0,2 g D-5-Indolylmethylhydantoin in 1000 ml 0,05 M Glycin-Puffer (Na^+ , pH 8,5) eingesetzt. Die Säule (16 ml Q-Sephrose) wurde auf 37°C temperiert und die Substratlösung mit einer Flußrate von 6,5 ml/min über die Säule gepumpt. Bei dieser Flußrate wurde eine Racemisierung von 29,6 % erreicht. Bei einer Flußrate von 2,8 ml/min, 1,25 ml/min bzw. 0,4 ml/min wurde eine Racemisierung von 60,8 %, 90,3 % bzw. 100 % erreicht.

Beispiel 12

Mit diesem Beispiel wurde die Eignung eines technischen Anionenaustauschers untersucht. Wie Fig. 3 zeigt, besteht auch hier ein linearer Zusammenhang zwischen Flußrate und Racemisierungsgeschwindigkeit (Umsatz). Das Säulenmaterial

(hydrophobe Polystyrolmatrix) adsorbiert in der Äquilibrierungsphase aber zunächst deutlich mehr IMH, als die oben verwendete Q-Sephrose (hydrophile Sepharosematrix).

Es wurde wie in Beispiel 11 verfahren, mit dem Unterschied, daß anstelle der Q-Sephrose Amberlite IRA-410 (analytical grade, Serva, Heidelberg, Gelvolumen 5,3 ml) verwendet wurde. Bei einer Flußrate von 5,0 ml/min wurde eine Racemisierung von 29,7 % ermittelt. Bei einer Flußrate von 2,5 ml/min, 1,25 ml/min bzw. 0,4 ml/min wurde eine Racemisierung von 54,4 %, 79,4 % bzw. 96 % erreicht.

Vergleichsbeispiel 2

Bei einem pH-Wert von 8,5 findet an dem stark sauren Kationenaustauscher Amberlite IR-122 analytical grade (16 ml Gelvolumen, Serva, Heidelberg) weder bei 3,0 ml/min noch bei 0,3 ml/min eine Racemisierung statt. Die Vergleichsbeispiele zeigen, daß Anionenaustauscherguppen für die Reaktion notwendig sind.

Beispiel 13

Unter Verwendung von tertiären bzw. quartären Ammonium-Verbindungen wird die Racemisierung von D-5-IMH an flüssigen Anionenaustauschern untersucht.

In einer auf 37 °C temperierten Polarimeterkuvette (5 ml Volumen) wird die Racemisierung von D-5-IMH on-line verfolgt. 4 ml Substratlösung (0,2 g D-5-IMH in 1000 ml 0,05 M Glycin-Puffer (Na⁺, pH 8,5)) werden mit 1 ml H₂O dest. (Blindansatz) bzw. einer wässrigen Lösung einer tertiären (2) oder quartären Ammoniumverbindung (3, 4) (doppelter Ansatz) versetzt, die mit NaOH auf einen pH von ebenfalls 8,5 eingestellt wurde. Die Racemisierung wurde über mindestens 24 h verfolgt. Als Zusätze wurden getestet:

1. H₂O dest. (Blindansatz)
2. Triethanolamin (0,5 M)
3. Hexadecyltrimethylammoniumbromid (0,05 M) ("Cetyltrimethylammoniumbromid")
4. Tetrabutylammoniumhydrogensulfat (0,5 M)

Während Triethanolamin keinen (1,2 %/h) und Tetrabutylammoniumhydrogensulfat einen geringfügig (1,8 %/h) schnelleren Umsatz bewirken als der Blindwert (1,2 %/h), zeigt Hexadecyltrimethylammoniumbromid schon bei einem Zehntel der Konzentration, der übrigen Substanzen, eine schnellere Racemisierung (4,3 %/h).

Zu erklären ist der Unterschied zwischen den beiden quartären Ammoniumverbindungen (Hexadecyltrimethylammoniumbromid und Tetrabutylammoniumhydrogensulfat) möglicherweise mit einer stärkeren Abschirmung der positiven Ladung

in der symmetrischen Verbindung.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Racemisierung von 5-mono-substituierten Hydantoinen, **dadurch gekennzeichnet**, daß man das zu racemisierende Hydantoin in einem Lösungsmittel bei einem pH im Bereich 6 - 13,5 mit einem Anionenaustauscher in Kontakt bringt.
2. Verfahren nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß ein organischer Anionenaustauscher verwendet wird.
3. Verfahren nach Anspruch 2, **dadurch gekennzeichnet**, daß ein Ionenaustauscher mit quartären Ammoniumgruppen oder vom DEAE-Typ verwendet wird.
4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Umsetzungstemperatur im Bereich von 0 - 100 °C liegt.
5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, daß das Lösungsmittel ein Puffersystem enthält.
6. Verfahren nach Anspruch 5, **dadurch gekennzeichnet**, daß das Verfahren in einem Glycin-Puffer durchgeführt wird.
7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, daß das zu racemisierende Hydantoin in einer Konzentration zwischen 0,1 - 250 g/l eingesetzt wird.
8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, daß ein Enantiomer des racemisierten Hydantoins enzymatisch zu einer enantiomerenreinen L- oder D-Aminosäure gespalten wird.
9. Verfahren nach Anspruch 8, **dadurch gekennzeichnet**, daß die enzymatische Spaltung mittels eines freien oder zellgebundenen Enzyms erfolgt.

10. Vorrichtung zur Racemisierung von 5-mono-substituierten Hydantoinen mit

- 1. einer Säule, die
 - 1.1. einen Eingang und
 - 1.2. einen Ausgang aufweist und die
 - 1.3. mit einem Anionenaustauscher gefüllt ist, wobei
- 2. Mittel vorgesehen sind, zur Versorgung der Säule mit einem sich in Lösung befindlichen zu racemisierenden Hydantoinen und
- 3. Mitteln zum Empfang des die Säule über den Auslaß verlassenden racemisierten, sich in Lösung befindlichen Hydantoins.

5

10

15

11. Verwendung der racemisierten Hydantoine, erhalten nach einem der Ansprüche 1 - 7, zur Darstellung enantiomerenreiner Aminosäuren.

20

25

30

35

40

45

50

55

7




FIG. 1




FIG.2




FIG.3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 92 11 8795

PAGE1

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. CL.5)
A,D	JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY Bd. 55, 1990, EASTON US Seiten 4755 - 4757 R.A. LAZARUS. * das ganze Dokument * ---	1	C07D233/76 C07D233/78 C07D233/74 C12P41/00 C12P13/04
A	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 85, no. 25, 20. Dezember 1976, Columbus, Ohio, US; abstract no. 192096k, K.H. DUDLEY ET AL. * Zusammenfassung * & DRUG METAB. DISPOS. Bd. 4, Nr. 4, 1976, Seiten 340 - 348 ---	1,5	
A	DATABASE WPIL Week 9126, Derwent Publications Ltd., London, GB; AN 91-188025 & JP-A-03 067 580 (EISHIN YAKUHI KOGY YOUNG JIN PHARM. CO.) * Zusammenfassung * ---	1	
A,D	AGRICULTURAL AND BIOLOGICAL CHEMISTRY Bd. 51, Nr. 3, 1987, TOKYO JP Seiten 721 - 728 K. YOKOZEKI AND K. KUBOTA. * Seite 724 * ---	1	C07D C12P C07C
A,D	G.C. BARRETT. 'Amino acids and peptides' 1989 * Seite 37 * ---	1	
A	WO-A-9 108 196 (SCHERING CORPORATION.) * Zusammenfassung * ---	1	
-/-			
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenamt BERLIN	Abschlußdatum der Recherche 01 FEBRUAR 1993	Prüfer FRELOD D.	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument --- & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 92 11 8795
PAGE2

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE		
Kategorie	Kenzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch
A,D	JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY Bd. 14, 1990, AMSTERDAM NL Seiten 345 - 362 C. SYLDATK ET AL. * Vorwort * -----	11
		KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.5)
		RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.5)
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt		
Recherchenort BERLIN	Abschlußdatum der Recherche 01 FEBRUAR 1993	Prüfer FRELON D.
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument A : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument		